

焦油紫染色液(0.06%)

产品货号: R23067

产品规格: 100ml

产品简介:

神经元细胞体包括一个具有皱褶核膜的大细胞核、稀疏的染色质和一个明显的核仁。在细胞体中细胞质是尼氏颗粒。尼氏颗粒可以用很多染色来显示如中性红、亚甲基蓝、甲苯胺蓝和甲基紫等。染色的变异、pH和分化的时间使一些染色既可以仅突出尼氏物质，也可以显示神经元的细胞核和神经胶质。尼氏体(Nissl body)或称尼氏小体是分布于神经细胞胞质内的三角形或椭圆形小块状物质，能被碱性染料如硫堇、亚甲蓝、甲苯胺蓝和焦油紫等染料染成紫蓝色。各种神经细胞内都含有尼氏体，但其形状、数量、分布位置常常不同。尼氏体也存在于树突中，但不在于轴突和包体的轴丘。尼氏体因为生理状态的变化而变化，尼氏体是神经元内合成蛋白质合成的重要部位，当神经元受到刺激后，包体内的尼氏体会明显减少。

尚宝生物 焦油紫染色液(0.06%)以进口焦油紫作为核心染料，焦油紫具有感光作用，能够很好地显示尼氏体的变化。本试剂操作简便、染色稳定、适用范围广，可以用于石蜡组织切片的尼氏物质、神经元等的染色。尼氏体的存在和消失是神经细胞是否受损的重要指标，当发生脑炎、脑缺血、轴突反应等情况，尼氏体会发生溶解，甚至消失。

产品组成:

名称	规格	保存条件
焦油紫染色液(0.06%)	100ml	室温，避光6个月

自备材料:

1. 系列乙醇
2. 恒温箱
3. 酒精灯
4. 蒸馏水
5. 70%乙醇或Nissl Differentiation
6. 显微镜

操作步骤(仅供参考):

1. 新鲜组织固定于乙醇、Carnoy 固定液或中性福尔马林溶液，常规脱水包埋。
2. 切片厚5μm，常规脱蜡至水。
3. 切片入Cresyl violet Stain，将染色缸置于56℃温箱浸染1h，酒精灯上加温使切片冒气泡为止(大约10min)。
4. 蒸馏水冲洗。
5. 入70%乙醇或Nissl Differentiation分化1~3min，在显微镜下观察至背景接近于无色为止。
6. 无水乙醇迅速脱水。二甲苯透明，中性树胶封固。

染色结果:

尼氏体	紫色
背景	接近于无色

注意事项:

1. 尼氏体离体后容易溶解，所以组织取出后应立即固定，否则难以着色。
2. 组织固定起着非常重要的作用，固定可采用乙醇、Carnoy固定液或中性福尔马林溶液。
3. 本染色试剂盒对石蜡组织切片的尼氏染色效果较好。
4. 石蜡切片厚度7~10μm或25μm(皮质神经元密度的评估要用25μm 厚的切片)。
5. 染色后的标本务必避光保存，否则容易褪色。
6. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物技术有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: shsunbao@126.com

http://www.saint-bio.com