

活化部分凝血活酶时间（APTT）检测试剂盒（凝固法）

产品货号：BA1620

产品规格：50T/100T

产品简介：

静脉血离体后至完全凝固所需的时间即为凝血时间，它是反映内源性凝血系统各凝血因子活性的筛选实验，活化部分凝血活酶时间(APTT)是利用在37℃以白陶土激活因子XII，以部分凝血活酶代替血小板提供凝血的催化表面，在Ca²⁺参与下，使纤维蛋白原转变为不溶性纤维蛋白，计算缺乏血小板的血浆凝固所需的时间。

尚宝生物 活化部分凝血活酶时间(APTT)检测试剂盒(凝固法)用于人、动物血液的活化凝血时间的测定，是反映内源性凝血系统较敏感和常用的筛选实验。该试剂盒仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

名称	50T	100T	保存条件
试剂(A): 柠檬酸钠抗凝剂(109mM)	10ml	20ml	室温
试剂(B): APTT白陶土溶液	5ml	10ml	2-8℃
试剂(C): CaCl ₂ (25mM)	5ml	10ml	2-8℃

自备材料：

1. 离心机
2. 计时器
3. 水浴锅

操作步骤 (仅供参考) :

1. 制备待测血浆：取新鲜待测静脉血与柠檬酸钠抗凝剂(109mM)按9:1混合，轻轻混匀，3000g离心10min，收集上层液(缺乏血小板的血浆)，转移至塑料试管或离心管，以防止血小板被激活；同时应设正常对照血浆。
2. 将白陶土-脑磷脂平衡至室温，颠倒混匀，取待测血浆(包括正常对照血浆)、APTT白陶土溶液各0.1ml，混匀。
3. 置于37℃水浴5min，期间轻轻混匀数次。
4. 加入经温育至37℃的CaCl₂(25mM)0.1ml，立刻计时，置于水浴中不断震荡，约30s时取出，观察出现纤维蛋白丝的时间，重复2次取平均值。

参考区间：

男性：31.5~43.5s；女性32~43s，待测者的测量值较正常值，对照值延长10s以上具有临床意义。

以上值仅供参考，由于试剂、人群、仪器等不同，会导致参考值不同，建议各实验室建立自己的参考范围。

注意事项：

1. 以上操作，应同时测定正常对照。
2. 获得样本后应及时检测，一般不应超过2h，37℃孵育时间不应少于3min。
3. 分离血浆应在3000g离心10min，务必去除血小板。

有效期： 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

QQ: 807961520

邮箱：saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com