

土壤木聚糖酶/土壤半纤维素酶(微板法)

产品货号: BA2806

产品规格: 48样

产品简介:

半纤维素酶主要检测木聚糖酶活力,是将木聚糖降解成低聚糖和木糖的一组酶的总称,广泛应用于酿造和饲料工业中。

土壤半纤维素酶在酸性环境下能将木聚糖降解成还原性寡糖和单糖,进一步在沸水浴条件下与3.5-二硝基水杨酸发生显色反应,在540nm处有特征吸收峰,反应液颜色的深浅与酶解产生的还原糖量成正比,通过测定反应液在540nm吸光值增加速率,即可计算该酶活力大小。

产品内容:

_	7						
	产品名称	规格	保存条件	备注			
	试剂一	液体100mL×1瓶	2-8°C				
	试剂二	液体15mL×1瓶	2-8°C				
	试剂三	液体20mL×1瓶	2-8°C				
	标准品	粉剂×1支	2-8°C	若重新做标曲,则用到该试剂。			

所需的仪器和用品:

酶标仪、96孔板、可调式移液器、天平、常温离心机、空气浴(恒温震荡仪)、水浴锅。

土壤半纤维素酶活性测定:

建议正式实验前选取2个样本做预测定,了解本批样品情况,熟悉实验流程,避免实验样本和试剂浪费!

1. 样本制备:

取新鲜土样或干土(风干或者37度烘箱风干), 先粗研磨, 过40目筛网备用。

【注】: 土壤风干,减少土壤中水分对于实验的干扰; 土壤过筛,保证取样的均匀细腻。

- 2. 上机检测:
 - ① 酶标仪预热 30min,调节波长至 540nm。
 - ② 在 EP 管中依次加入:

试剂名称(μL)	测定管	对照管
土样 (g)	0.3	0.3
试剂一	600	900
试剂二	300	

充分混匀,40℃培养6小时(振荡培养或间隔一段时间手动振荡混匀几下), 12000rpm,25℃离心10min,上清液待用。

③ 显色反应, 在 EP 管中依次加入:

上清液	40	40		
试剂三	200	200		
混匀,沸水浴(95-100℃,可用封口膜缠紧,防止水分流水)5min后,冷却				
至室温				
蒸馏水	800	800		



地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号 电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520 邮箱: saintbio@126.com http://www.saint-bio.com




混匀, 若浑浊则 8000rpm 室温离心 5min, 取 200μL 液体至 96 孔板中, 于 540nm 处读取吸光值 A, ΔA=A 测定管-A 对照管。

【注】: 1.若ΔA 较小,可延长 40℃的孵育时间 T(如 24 小时或更长),或增加土样质量 W,或增加③步显色反应 步骤中的上清液 V1(如由 40μL 增至 240μL 或更多,则蒸馏水相应减少)。则改变后的 T 和 W 和 V1 需代入计算公式重新计算。

2.若测定管 A 值大于 1.5 或 Δ A 大于 1, ③步显色反应步骤中的上清液可用蒸馏水稀释,则稀释倍数 D 代入公式 计算。

结果计算:

1. 标准曲线方程: y=7.5568x+0.0007, x是标准品质量(mg), y是ΔA。



2. 酶活定义: PH4.8条件下,每克土壤每天分解木聚糖产生1mg还原糖所需的酶量为一个酶活单位。 土壤半纤维素酶活力(mg/d/g 土样)= $[(\Delta A-0.0007)\div7.5568]\times(V2\div V1)\div W\div T\times D$

$$=12\times(\Delta A-0.0007)\div W\times D$$

V1---显色反应中上清液体积, 40μ L=0.04mL; V2---反应总体积, 900μ L=0.9mL; T---反应时间,1/4d; W---土壤样本质量,g; D--稀释倍数,未稀释即为1。

附:标准曲线制作过程:

- 1. 制备标准品母液(5mg/mL): 向标准品EP管里面加入1mL蒸馏水(母液需在两天内用且-20℃保存)。
- 2. 把母液稀释成六个浓度梯度的标准品: 0,1,2,3,4,5.mg/mL。也可根据实际样本来调整标准品浓度。
- 3. 在显色反应阶段,按照测定管加样表操作,依据结果即可制作标准曲线。



上海尚宝生物科技有限公司 Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号 电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520 邮箱: saintbio@126.com http://www.saint-bio.com