

海藻糖-6-磷酸合成酶(TPS)测试盒(紫外分光光度法)

正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定

产品货号: BA2342

产品规格: 50管/48样

测定意义:

海藻糖是由两个葡萄糖分子以 α , α -1-1 糖苷键连接而成的一种非还原双糖, 广泛存在于细菌、酵母菌、霉菌、食用菌、低等植物、昆虫、无脊椎动物和高等植物等多种有机体中。海藻糖的非还原性决定了它对酸、碱、高温等的稳定性。另外, 它本身具有很强的吸水性, 使它在生物体内具有抗脱水作用, 在逆境条件下可通过识别外界刺激、产生和传递信号、基因表达和代谢调节来保护植物免受不良环境的伤害。

植物体内主要以葡萄糖为底物合成海藻糖, 该反应首先在海藻糖-6-磷酸合成酶(trehalose-6-phosphate synthase, TPS)的作用下, 催化尿苷二磷酸葡萄糖(UDPG)和 6-磷酸葡萄糖反应生成中间产物 6-磷酸海藻糖, 再在海藻糖-6-磷酸磷酸酶(trehalose-6-phosphate phosphatase, TPP)的作用下去磷酸化, 生成海藻糖。因此, 测定 TPS 活性对于研究植物逆境具有重要意义。

测定原理:

TPS 催化 UDPG 与 G6P 生成海藻糖-6-磷酸, 同时产生 UDP; UDP 在丙酮酸激酶与乳酸脱氢酶作用下, 氧化 NADH 为 NAD^+ , NADH 的下降速率与 UDP 含量成正比, 通过 340nm 吸光度下降速率反映 TPS 活性。

需自备的仪器和用品:

分光光度计、水浴锅、可调式移液器、1mL 石英比色皿、研钵、冰和蒸馏水。

试剂的组成和配制:

提取液: 液体 100mL $\times$ 1 瓶, 4 $^{\circ}\text{C}$ 保存;

试剂一: 粉剂 $\times$ 1 瓶, -20 $^{\circ}\text{C}$ 保存; 临用前加入 10mL 试剂五溶解, 用不完的试剂分装后-20 $^{\circ}\text{C}$ 保存, 禁止反复冻融;

试剂二: 粉剂 $\times$ 2 瓶, -20 $^{\circ}\text{C}$ 保存; 临用前每瓶加入 25mL 试剂五溶解; 现配现用;

试剂三: 粉剂 $\times$ 1 瓶, -20 $^{\circ}\text{C}$ 避光保存; 临用前加入 0.1mL 试剂五溶解, 用不完的试剂分装后-20 $^{\circ}\text{C}$ 保存, 禁止反复冻融;

试剂四: 100 μL $\times$ 1 瓶, 4 $^{\circ}\text{C}$ 避光保存; 临用前低速离心, 以防止试剂沾在管壁;

试剂五: 液体 100mL $\times$ 1 瓶, 4 $^{\circ}\text{C}$ 保存;

工作液的配制: 临用前, 先配置好 1 瓶试剂二和试剂三, 然后在试剂二瓶中加入 25 μL 试剂三和 25 μL 试剂四, 充分混匀, 现配现用。

样品测定的准备:

1. 细菌或细胞的处理: 收集细菌或细胞到离心管内, 离心后弃上清; 按照细菌或细胞数量 (10^4 个): 提取液体积 (mL) 为 500~1000: 1 的比例 (建议 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液), 超声波破碎细菌或细胞 (冰浴, 功率 20% 或 200W, 超声 3S, 间隔 10S, 重复 30 次); 8000g, 4 $^{\circ}\text{C}$ 离心 10min, 取上清, 置冰上待测。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>

- 组织的处理：按照组织质量（g）：提取液体积（mL）为 1：5~10 的比例（建议称取约 0.1g 组织，加入 1mL 提取液），冰浴中匀浆。8000g，4℃ 离心 10min，取上清，置冰上待测。

测定步骤：

- 在 EP 管中加入如下试剂

试剂名称（μL）	测定管
样本	150
试剂一	150

混匀，30℃ 反应 20min，95°水浴 2min 灭活，冷却至室温。10000g 4℃ 离心 5min，取上层反应液待测。

- 工作液配制：详见试剂的组成和配制中工作液的配制。
- 在 1mL 玻璃比色皿中加入如下试剂

反应液	100
工作液	900

混匀，测定 340nm 下 5min 后吸光值 A1 与 10min 后吸光值 A2， $\Delta A = A1 - A2$ 。

TPS 活力计算：

- 按照蛋白浓度计算

单位的定义：每 mg 组织蛋白每分钟催化 1nmol NADH 定义为一个酶活力单位。

$$\text{TPS 活力}(\text{nmol/min/mg prot}) = \Delta A \times V_{\text{反总}} \div (\epsilon \times d) \times 10^9 \div (V_{\text{样}} \times C_{\text{pr}}) \div T \times 3 = 643 \times \Delta A \div C_{\text{pr}}$$

- 按样本鲜重计算

单位的定义：每 g 组织每分钟催化 1nmol NADH 定义为一个酶活力单位。

$$\text{TPS 活力}(\text{nmol/min/g 鲜重}) = \Delta A \times V_{\text{反总}} \div (\epsilon \times d) \times 10^9 \div (W \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}}) \div T \times 3 = 643 \times \Delta A \div W$$

- 按细菌或细胞密度计算

单位的定义：每 1 万个细菌或细胞每分钟催化 1nmol NADH 定义为一个酶活力单位。

$$\text{TPS 活力}(\text{nmol/min}/10^4 \text{ cell}) = \Delta A \times V_{\text{反总}} \div (\epsilon \times d) \times 10^9 \div (V_{\text{样}} \times \text{细胞数量}) \div T \times 3 = 1.28 \times \Delta A$$

V 反总：反应体系总体积，1mL； ϵ ：NADH 摩尔消光系数， $6.22 \times 10^3 \text{ L/mol/cm}$ ；d：比色皿光径，1cm；V

样：加入样本体积，0.15mL；V 样总：加入提取液体积，1mL；T：反应时间，5min；3，稀释倍数；Cpr：样本蛋白质浓度，mg/mL；W：样本质量；细胞数量，500 万。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱：saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com